


Els antiinflamatoris tipus aspirina o ibuprofè i les malalties del cor, renals o del fetge




Les persones amb malalties del cor, renals o malalties del fetge no haurien de prendre de manera rutinària antiinflamatoris no esteroïdals (tipus aspirina o ibuprofè)

L'Essencial és una iniciativa de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que identifica pràctiques clíniques de poc valor i promou recomanacions per tal d'evitar-ne la realització. Aquestes recomanacions són consensuades i avalades per les societats científiques, els professionals sanitaris, els pacients i l'AQuAS.

Aquesta fitxa és una recomanació adreçada als ciutadans per a l'ajuda a la presa de decisions en l'atenció sanitària i ha comptat amb la col·laboració de la CAMFiC-Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i el suport de la Societat Catalana de Cardiologia i la Societat Catalana de Nefrologia. No és de compliment obligat ni substitueix el judici clínic del personal sanitari.

Què són els antiinflamatoris no esteroïdals (AINE)?

Els antiinflamatoris no esteroïdals (tipus aspirina o ibuprofè) són medicaments que reduïxen els símptomes de la inflamació, el dolor i la febre. Actualment són uns dels fàrmacs més utilitzats i poden produir efectes secundaris en pacients amb malalties del cor, renals o del fetge.



Els antiinflamatoris tipus aspirina o ibuprofè i les malalties del cor, renals o del fetge

Per què els pacients amb malalties de cor, renals o del fetge no han de prendre de manera rutinària antiinflamatoris no esteroïdals?

- Els resultats dels estudis mostren que aquests tipus d'antiinflamatoris poden afavorir la descompensació de la insuficiència cardíaca.
- Cal evitar-ne l'ús o extreure la precaució pel risc de pèrdua sobtada de la funció renal en pacients fràgils, amb edat avançada, que prenen més de 5 medicaments, i que a més prenen medicaments per al cor i per a la hipertensió arterial.
- Els AINE estan contraindicats en pacients amb malaltia del fetge greu. En pacients amb malaltia de fetge lleu s'hauria de reduir la dosi i fer controls analítics..

-
- Per a la redacció d'aquesta recomanació s'ha comptat amb la participació i col·laboració del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
 - La recomanació completa es pot consultar a la pàgina web del **Projecte Essencial** <http://essencialsalut.gencat.cat>
 - Per a qualsevol informació addicional pot adreçar-se al telèfon 061

Alguns drets reservats:

©2016 Generalitat de Catalunya. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObres Derivades 4.0 Internacional. La llicència es pot consultar a: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca>